

ANTADDICT.COM

ÉDITION 2026



GUIDE DE TERRAIN - CANADA

Le Calendrier des Vols Nuptiaux des Fourmis



Quand les reines prennent leur envol — un guide mois par mois pour capturer des reines partout au Canada.

Un compagnon de terrain gratuit pour
les éleveurs de fourmis et les chasseurs de reines

Propulsé par ColonyCue
antaddict.com

Les 6 règles de la chasse aux reines

Un vol nuptial est le jour où une colonie envoie ses reines et ses mâles ailés dans les airs pour s'accoupler. La saison canadienne est courte et intense — manquez la bonne fenêtre météo et vous attendez une année complète. Ces six règles déterminent si vous rentrez avec une reine.

1 Respectez la courte saison

Les vols au Canada s'étalent grosso modo de la **fin avril à octobre**, l'essentiel se passant de mai à septembre. Tout arrive **plus tard que sur les calendriers du nord des États-Unis** : fiez-vous aux données canadiennes.

2 Attendez la chaleur

La plupart des vols exigent des après-midis chauds d'environ **20 à 30 °C** — *Camponotus herculeanus*, par exemple, vole autour de 25 °C. Une journée fraîche et grise garde les colonies sous terre.

3 Suivez la pluie

Le déclencheur classique : la **première journée chaude et humide après une bonne pluie**. Le sol ramolli permet aux jeunes reines de creuser, et l'humidité les protège en vol.

4 Connaissez l'horaire

Le moment varie selon l'espèce : beaucoup de *Camponotus* et de *Lasius* volent de **l'après-midi au crépuscule** ; les fourmis des pavés et moissonneuses préfèrent l'après-midi et le soir. Le tableau de chaque mois vous le précise.

5 La côte et le sud volent d'abord

La côte de la Colombie-Britannique et la ceinture du sud — sud de l'Ontario et du Québec — se réchauffent en premier. Les **Prairies, le Nord et les Maritimes** suivent de quelques jours à quelques semaines.

6 Encerclez la fête du Travail

Le plus grand vol de l'année — les immenses essaims de *Lasius neoniger* — se concentre **fin août et en septembre**, souvent autour du long week-end de la fête du Travail. C'est le grand final.

Comment lire ce guide : chaque mois indique les espèces les plus susceptibles de voler, leur période de pointe, le déclencheur météo à surveiller et une cote de difficulté de capture (★ facile → ★★★ ardu). Une reine sans ailes qui marche au sol s'est déjà accouplée et est prête à fonder une colonie — c'est elle que vous voulez.

Janvier – Mars

PLEIN HIVER
la longue morte-saison

La neige et le sol gelé signifient aucun vol nulle part au Canada. La saison de chasse est loin — mais c'est le moment où les bons éleveurs se préparent.

CE QUI SE PASSE	STATUT	PÉRIODE	NOTES	CAPTURE
Aucun vol nuptial <i>Toutes les espèces en hibernation</i>	FERMÉ	Janv. – mars	Sol gelé ; colonies en diapause profonde	—

NOTE D'ÉLEVEUR Vos colonies établies devraient reposer au frais en ce moment (voir la note de décembre). Profitez de ces mois pour nettoyer et préparer vos tubes à essai et vos aires de fourragement. Les premiers vols de l'année — la fourmi d'hiver et, dans l'Ouest, les charpentières boréales — commencent avec le dégel, en avril.

Les tout premiers vols de l'année canadienne. À mesure que la neige disparaît dans le sud et l'ouest, les plus précoces testent l'air dès les premiers après-midis vraiment chauds.

ESPÈCE	STATUT	MEILLEURE PÉRIODE	DÉCLENCHEUR	CAPTURE
Fourmi d'hiver <i>Prenolepis imparis</i>	ACTIVE	Avr.–mai (sud du Canada)	Après-midis doux de 12 à 18 °C après un redoux	★★
Fourmi charpentière boréale <i>Camponotus herculeanus</i>	DÉBUT	Fin avr. (ouest chaud)	Après-midis calmes et chauds ~25 °C	★

NOTE D'ÉLEVEUR *Prenolepis imparis*, la « fourmi d'hiver », est la véritable ouvreuse — elle vole dès les premières journées douces du printemps, souvent avant que les arbres soient en feuilles, surtout dans le sud de l'Ontario, au Québec et sur la côte de la Colombie-Britannique. Guettez ce premier après-midi chaud et calme.

Mai

PRINTEMPS

le mois des charpentières boréales

Le printemps s'installe. Dans l'ouest boréal et le nord, les grandes charpentières des montagnes prennent leur envol — l'une des captures phares du début de saison au Canada — pendant que les fourmis des champs s'éveillent.

ESPÈCE	STATUT	MEILLEURE PÉRIODE	DÉCLENCHEUR	CAPTURE
Fourmi charpentière boréale <i>Camponotus herculeanus</i>	PIC	Pic en mai (boréal/Ouest)	Après-midis calmes et chauds ~25 °C, souvent après la pluie	★
Fourmi d'hiver <i>Prenolepis imparis</i>	ACTIVE	Fin de la période avr.–mai	Après-midis chauds	★★
Fourmis des bois et des champs <i>Formica spp.</i>	DÉBUT	Montée vers le pic de juillet	Après-midis chauds, ensoleillés et calmes	★★

NOTE D'ÉLEVEUR *Camponotus herculeanus* est un géant robuste adapté au froid — un trophée pour les éleveurs des Prairies, des régions boréales et du Nord. Elle est entièrement claustrale et idéale pour débiter. Les éleveurs de l'Alberta observent régulièrement des vols à la fin de mai lors d'après-midis chauds d'environ 25 °C.

La ceinture sud rattrape son retard. En Ontario, au Québec et dans les Maritimes, les charpentières noire et de New York s'envolent, les fourmis des pavés essaient en ville et les fourmis des champs montent en puissance.

ESPÈCE	STATUT	MEILLEURE PÉRIODE	DÉCLENCHEUR	CAPTURE
Charpentières noire et de New York <i>Camponotus pennsylvanicus & novaeboracensis</i>	PIC	Pic en juin (sud du Canada)	Soirées chaudes et humides après la pluie	★
Fourmi des pavés <i>Tetramorium immigrans</i>	ACTIVE	Juin–juill. (milieu urbain)	Soirées chaudes ; essaims synchronisés	★
Fourmis des bois et des champs <i>Formica spp.</i>	ACTIVE	Montée vers le pic de juillet	Après-midis chauds, ensoleillés et calmes	★★

NOTE D'ÉLEVEUR Les éleveurs du sud de l'Ontario capturent *Camponotus pennsylvanicus* et *novaeboracensis* de la mi-juin à la fin juin — de grandes charpentières robustes, entièrement claustrales et parfaites pour une première colonie. Inspectez les lumières de porche, les murs et les trottoirs au crépuscule, après une pluie chaude.

Juillet

CŒUR DE L'ÉTÉ

le sommet de la diversité

Le mois le plus occupé et le plus varié. Les fourmis des champs culminent, les fourmis des pavés atteignent leur apogée, les fourmis des sous-bois et acrobates s'ajoutent, et dans le sud des Prairies les moissonneuses volent après les orages d'été.

ESPÈCE	STATUT	MEILLEURE PÉRIODE	DÉCLENCHEUR	CAPTURE
Fourmis des bois et des champs <i>Formica spp.</i>	PIC	Pic en juillet	Après-midis chauds, ensoleillés et calmes	★★
Fourmi des pavés <i>Tetramorium immigrans</i>	PIC	Pic en juillet (urbain)	Soirées chaudes ; essaims synchronisés	★
Fourmis des sous-bois <i>Aphaenogaster spp.</i>	ACTIVE	Juill.–sept.	Après-midis chauds et humides après la pluie	★★
Fourmi moissonneuse (Prairies) <i>Pogonomyrmex occidentalis</i>	ACTIVE	Juill.–août (AB/SK)	Après-midi après un orage d'été	★★
Fourmi acrobate <i>Crematogaster cerasi</i>	DÉBUT	Montée vers le pic d'août	Journées chaudes et humides après la pluie	★★

NOTE D'ÉLEVEUR Dans les prairies du sud de l'Alberta et de la Saskatchewan, *Pogonomyrmex occidentalis* est la seule véritable fourmi moissonneuse du Canada — une capture régionale distinctive qui vole dans la chaleur de l'après-midi, après un orage estival.

Les fourmis des sous-bois et acrobates culminent, les fourmis rouges démarrent et — surtout — les immenses vols de *Lasius neoniger* commencent à monter vers le grand final de l'année.

ESPÈCE	STATUT	MEILLEURE PÉRIODE	DÉCLENCHEUR	CAPTURE
Fourmis des sous-bois <i>Aphaenogaster spp.</i>	PIC	Pic en août	Après-midis chauds et humides après la pluie	★★
Fourmi acrobate <i>Crematogaster cerasi</i>	PIC	Pic en août	Journées chaudes et humides après la pluie	★★
Fourmi des gazons <i>Lasius neoniger</i>	ACTIVE	Montée vers le pic de septembre	Après-midis chauds, humides et calmes après la pluie	★★
Fourmis rouges <i>Myrmica spp.</i>	ACTIVE	Août–sept.	Après-midis chauds et humides	★★
Fourmis jaunes parasites <i>Lasius umbratus & claviger</i>	DÉBUT	Montée vers septembre	Journées chaudes et humides de fin d'été	★★★

NOTE D'ÉLEVEUR Surveillez l'humidité en fin de mois. Un après-midi lourd et calme après une pluie d'août est la configuration classique des premiers grands vols de *Lasius neoniger* — l'avant-garde du plus grand événement fourmilier du Canada.

Septembre

DÉBUT DE L'AUTOMNE
★ le final des Lasius ★

L'événement phare de l'année fourmilière canadienne. Autour du week-end de la fête du Travail, des après-midis chauds et humides déclenchent les immenses vols synchronisés de *Lasius neoniger* — des reines par milliers.

ESPÈCE	STATUT	MEILLEURE PÉRIODE	DÉCLENCHEUR	CAPTURE
Fourmi des gazons <i>Lasius neoniger</i>	PIC	Pic début sept. (fête du Travail)	Après-midi chaud, humide et calme après la pluie	★★
Fourmis rouges <i>Myrmica spp.</i>	PIC	Pic en septembre	Après-midis chauds et humides	★★
Fourmis jaunes parasites <i>Lasius umbratus & claviger</i>	PIC	Sept.–oct.	Journées chaudes, calmes et humides	★★★
Fourmis des sous-bois <i>Aphaenogaster spp.</i>	ACTIVE	Fin de la saison	Après-midis chauds et humides	★★

NOTE D'ÉLEVEUR Encerclez le premier après-midi chaud et humide autour de la fête du Travail. Les reines de *Lasius neoniger* sortent en très grand nombre et sont entièrement claustrales — une excellente espèce, robuste et idéale pour débiter. Les éleveurs avancés profitent de cette même fenêtre pour trouver des reines de *Lasius* parasites destinées aux colonies à parasitisme social.

Octobre

MILIEU DE L'AUTOMNE
la saison se termine

Les derniers vols de l'année. Dans le sud plus doux, quelques *Lasius* et fourmis rouges terminent lors des ultimes après-midis chauds — puis la saison de vol du Canada s'arrête jusqu'au printemps.

ESPÈCE	STATUT	MEILLEURE PÉRIODE	DÉCLENCHEUR	CAPTURE
Fourmis jaunes parasites <i>Lasius umbratus & claviger</i>	ACTIVE	Jusqu'au début octobre	Derniers après-midis chauds et calmes	★★★
Fourmi des gazons <i>Lasius neoniger</i>	ACTIVE	Derniers vols (sud doux)	Après-midis chauds et humides	★★
Fourmis rouges <i>Myrmica spp.</i>	ACTIVE	Dernières retardataires	Après-midis doux et humides	★★

NOTE D'ÉLEVEUR N'abandonnez pas au premier avertissement de gel — un redoux d'octobre dans le sud peut provoquer un dernier vol des espèces automnales. Mais une fois le froid bien installé, la saison est terminée jusqu'en avril prochain.

Novembre & Décembre

HIVER
la morte-saison

L'année de chasse est terminée et le long hiver canadien s'installe. Ces mois sont consacrés à l'hibernation et à la planification — la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vos colonies de l'an prochain.

CE QUI SE PASSE	STATUT	PÉRIODE	NOTES	CAPTURE
Aucun vol nuptial <i>Colonies en hibernation</i>	FERMÉ	Nov. – déc.	Sol gelé ; faites hiverner vos colonies	—

NOTE D'ÉLEVEUR Les hivers canadiens exigent une **HIBERNATION LONGUE ET VÉRITABLE**. Les espèces indigènes (Camponotus, Lasius, Formica, Myrmica) ont besoin d'un repos au frais entre **2 ET 8 °C** — réfrigérateur, chambre froide ou sous-sol non chauffé — pendant environ **3 À 5 MOIS**. C'est essentiel, pas optionnel. Guettez ensuite la fourmi d'hiver et les charpentières boréales au retour du dégel, en avril.

L'année canadienne en un coup d'œil

Chaque grande espèce d'élevage canadienne et sa période de vol sur une seule page. **Foncé = pic**, or = active, pâle = début ou fin. La côte de la C.-B. et le sud volent en premier ; les Prairies, le Nord et les Maritimes suivent.

ESPÈCE	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Fourmi d'hiver <i>Prenolepis imparis</i>				Foncé	Or							
Charpentière boréale <i>Camponotus herculeanus</i>				Pâle	Foncé	Or						
Charpentières noire et de N.Y. <i>Camponotus pennsylvanicus & novaeboracensis</i>					Pâle	Foncé	Or					
Fourmis des bois et des champs <i>Formica spp.</i>					Pâle		Foncé	Or				
Fourmi des pavés <i>Tetramorium immigrans</i>						Or	Foncé					
Fourmi moissonneuse (Prairies) <i>Pogonomyrmex occidentalis</i>							Or	Or				
Fourmis des sous-bois <i>Aphaenogaster spp.</i>							Or	Foncé	Or			
Fourmi acrobate <i>Crematogaster cerasi</i>							Pâle	Foncé	Or			
Fourmi des gazons <i>Lasius neoniger</i>							Pâle	Or	Foncé	Or		
Fourmis rouges <i>Myrmica spp.</i>							Pâle	Or	Foncé	Or		
Fourmis jaunes parasites <i>L. umbratus & claviger</i>								Pâle	Foncé	Or		

 Vol au pic  Active  Début / fin Les périodes sont des moyennes nationales — fiez-vous toujours à la météo locale.

Vous avez capturé une reine — et maintenant ?

Une reine sans ailes qui marche au sol s'est déjà accouplée. Voici comment la ramener chez vous et fonder votre première colonie comme il faut.

1

Confirmez qu'elle est accouplée

Cherchez une fourmi plus grande, au thorax volumineux et **sans ailes** (ou avec des moignons d'ailes). Sans ailes et qui marche = accouplée et prête. Encore ailée = elle n'a peut-être pas encore volé.

2

Recueillez-la délicatement

Faites-la entrer dans un petit contenant — ne la pincez jamais. Un pilulier propre ou un tube fait l'affaire. Lors d'un grand vol de *Lasius neoniger*, on en ramasse des dizaines en quelques minutes.

3

Préparez un montage en tube à essai

Remplissez le quart d'un tube à essai d'eau, bouchez-le avec une boule de coton bien serrée pour retenir un réservoir, ajoutez la reine, puis obturez l'extrémité ouverte avec une seconde boule de coton.

4

Sombre, chaud, tranquille

Gardez le tube dans un tiroir à température ambiante (environ 20 à 24 °C). **Ne la dérangez pas sans cesse** — le stress est la cause numéro un de la mort des reines fondatrices. Un coup d'œil par semaine suffit amplement.

5

Sachez si elle doit être nourrie

Les reines entièrement claustrales (*Camponotus*, *Lasius*, *Prenolepis*) élèvent leurs premières ouvrières sur leurs propres réserves — **ne les nourrissez pas**. Les reines semi-claustrales (*Pogonomyrmex*, *Myrmica*) ont besoin d'un peu de nourriture. Les reines de *Lasius* parasites et du groupe *Formica rufa* exigent une colonie hôte (niveau avancé).

6

Attendez les nanitiques — puis l'hivernage

Elle élèvera ses premières minuscules ouvrières (« nanitiques ») en quelques semaines. Les reines capturées tard devront peut-être hiverner avant de produire des ouvrières — les espèces canadiennes exigent chaque hiver une véritable hibernation au froid pour prospérer.

Une reine, une règle : la patience. Les éleveurs qui perdent leurs reines sont presque toujours ceux qui ouvrent le tube trop souvent. Notez la date et l'espèce de votre capture — puis laissez-la tranquille et laissez la nature faire son œuvre.

SUIVEZ CHAQUE VOL EN TEMPS RÉEL

Ne manquez plus jamais un **vol nuptial**.

Ce calendrier vous dit *quand* chercher. **ColonyCue** vous dit quand ça se produit *en ce moment même* — ajusté à votre coin du Canada — et vous aide à élever chaque reine que vous capturez.

- Alertes de vol locales ajustées à votre province et à la météo
- Enregistrez vos reines et suivez la fondation
- Fiches d'entretien pour *Camponotus*, *Lasius*, *Myrmica* et plus
- Guides et carnets d'éleveur gratuits d'AntAddict

Commencez gratuitement sur colonycue.app →